

Hausse de la malnutrition chronique sévère au Burkina Faso : une menace des efforts de réduction de la mortalité des enfants

SAVADOGO Yacouba; NABIE Douba; OUATTARA Karim; MILLOGO Roch, LANKOANDE Bruno & MAÏGA Abdoulaye

- Institut Supérieur des Sciences de la Population www.issp.bf
- Contacts : lankyem@yahoo.fr/modesterevo@yahoo.fr/nabiedouba11@gmail.com

Introduction

Pour éliminer les décès évitables des enfants de moins de 5 ans d'ici 2030, le Burkina Faso met en œuvre plusieurs interventions de lutte contre la malnutrition des enfants selon la politique nationale multisectorielle de nutrition 2018-2027. Le suivi et l'évaluation de toutes ces initiatives nécessitent une analyse fine des progrès réalisés en matière de nutrition des enfants, en mettant en évidence les inégalités spatiales pour identifier les populations les plus exposées. Certaines régions du pays subissant des attaques terroristes depuis 2016 qui entraînent une dégradation de leurs conditions de vie et un déplacement massif de populations.

Données et méthodes

Les données mobilisées pour appréhender l'évolution de la malnutrition des enfants sont celles des enquêtes SMART du Burkina Faso. L'analyse couvrant la période 2011-2020 est faite sur les enfants de moins de 5 ans, au niveau national et régional pour cerner les progrès du pays afin de mettre en évidence les inégalités et mieux cibler les interventions. Bien que plusieurs indicateurs clés de la malnutrition soient disponibles, cette étude s'intéresse à la malnutrition chronique sévère qui semble plus marquée que les autres formes.


Résultats

Figure 1. Tendence de la malnutrition chronique sévère des enfants depuis 2011




- Arrêt en 2017 de la tendance à la baisse de la malnutrition chronique sévère, suivie d'une dégradation continue.
- Proportion d'enfants malnutris, de 5% en 2017 à 10% en 2020.

Figure 2. Évolution entre 2017 et 2020 de l'état nutritionnel des enfants dans les deux principales villes




- Hausse de la malnutrition chronique sévère depuis 2017 dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins.
- Une situation qui pourrait être associée à l'afflux des personnes déplacées internes (PDI) dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Figure 3. Evolution entre 2017 et 2020 de l'état nutritionnel des enfants dans les zones à forts défis sécuritaires



- Dégradation de la situation des enfants de moins de cinq ans depuis 2017 dans les régions du Nord, Centre-Nord et Sahel.
- Des régions en proie à la crise sécuritaire, alimentaire associées à un accès limité aux soins de santé.

Figure 4. Tendence de l'état nutritionnel des enfants dans les autres régions du pays



- Quatre régions ont connu une amélioration de l'état nutritionnel, Cascades, Sud-Ouest, Boucle du Mouhoun et Centre-Est.
- Pas de changement au Centre-Ouest et l'Est.
- Dégradation de la situation nutritionnelle au Plateau central et Centre-Sud.

Recommandations

- Mettre un système efficace de ciblage des ménages indigents avec les enfants vulnérables y compris les PDI ;
- Mettre à contribution les agents de santé à base communautaire (ASBC) dans le ciblage, la promotion et la prise en charge de la nutrition des enfants ;
- Promouvoir des initiatives locales de proximité adaptées au nouveau contexte sécuritaire et ses conséquences ;
- Développer des interventions prenant en compte des contextes urbains vulnérables ;
- Poursuivre et renforcer les interventions d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (AJNE) ;
- Faciliter l'intégration sociale et professionnelle des PDI dans les zones d'accueil, accompagnement des activités génératrices de revenus.

References

- Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), & Agence de Formation, de Recherche & d'Expertise en Santé en Afrique (AfricSanté). (2022). Analyse des indicateurs de santé maternelle, néonatale, des enfants, des adolescents et nutrition au Burkina Faso. (86 p).